







Noctules (2)

AB < 46 mm

Poil du pelage du dos
brun-noir, bicolores

Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri

AB > 48 mm


Poil du pelage du dos
brun-roux, uniformes

Noctule commune
Nyctalus noctula

AB > 64 mm


Poil du pelage du dos
brun-roux, uniformes

Grande Noctule
Nyctalus lasiopterus



Sérotines et vespertilion (3)

Ailes étroites
Dos brun sombre et pointe des
poils argentée
Ventre gris-blanc




Vespertilion bicolore
Vespertilio murinus

Ailes larges

AB > 48 mm

Longs poils de couleur uniforme
Ventre brun jaunâtre - beige


Sérotine commune
Cnephaeus serotinus




AB < 42 mm

Dos brun noirâtre et pointe des
poils doré
Ventre brun jaunâtre - beige

Sérotine de Nilsson
Cnephaeus nilssoni




Pipistrelles (4)



Parfois liseré blanc à
jaunâtre, diffus < 1 mm


P³ bien visible, C¹ et
P⁴ ne se touchent pas



AB : 32,2-37,1 mm


Uropatagium velu
jusqu'à la ½

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii



Souvent liseré blanc net 1-5 mm
Sur le bord du plagiopatagium

P³ quasi invisible, C¹
et P⁴ se touchent



AB : 32,2-37,1 mm


Uropatagium peu velu
- de la ½

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii



Parfois liseré blanc diffus
< 1 mm


P³ peu visible, C¹ et P⁴
ne se touchent pas



AB : 29,2-33,5 mm

Uropatagium peu velu
- de la ½

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus





Pas de liseré blanc

I¹ bicuspidé et
légèrement plus
longue que I²

AB : 27,7-32,3 mm


Tiers proximal de
l'uropatagium très velu

Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus






AB < 37 mm




Murins « à moustaches » sl (3)

P⁴ AVEC protoconule visible




Pelage frontal droit s'arrêtant bien avant le museau

P⁴ SANS protoconule visible de côté



P⁴ AVEC protoconule A PEINE visible



Petites bosses sur les joues
Parties nues brunes
Tagus brun-clair
Oreilles plus larges

Narines en forme de ♥



Pénis renflé, en massue, mais parfois filiforme notamment chez les juvéniles

Epiblème étroit généralement présent

AB : 32,9-34,8 – 36,3-38,2 mm


Murin de Brandt
Myotis brandtii



Parties nues très foncées (noires)
Tragus noir, plus clair à la base

AB : 31,9-33,5 – 35,3-36,6 mm

Murin à moustaches
Myotis mystacinus



Pénis filiforme (long et étroit)

Pelage frontal bombé s'arrêtant au museau formant une crête de profil
Zone glabre autour des yeux


Narines en forme de ♥

Partie nues brunes
Tragus brun-clair, plus clair à la base

AB : 30,4-31,4 - 32,7-33,9 mm

Murin d'Alcathoe
Myotis alcathoe

⚠ Confusion possible avec groupe des Murins à moustaches : certains individus (juvéniles) de Murins de Daubenton ont des pieds plus petits ou un museau foncé
→ regarder le tragus



Murins « pêcheurs » (2)

